

# Provocatie/ desensibilisatie bij/wesp

## Inleiding

Bij de vaststelling en behandeling van overgevoelighedsreacties op bijen- of wespengif onderscheiden we drie stappen:

- Onderzoeken naar de overgevoeligheid.
- Desensibilisatiekuur, duur 3 tot 5 jaar in overleg met uw arts.
- Controle provocatie.

## Vaststelling van de overgevoeligheid

Nadat u bij de longarts bent geweest kunt u bij het laboratorium bloed laten prikken. Ook krijgt u een afspraak mee voor de huidallergietest. Aan de hand van de uitslagen van deze test en het bloedonderzoek wordt u geadviseerd of het zinvol is de desensibilisatiekuur te volgen.

## Desensibilisatiekuur

Het doel van de kuur is weerstand op te wekken tegen het gif van de bijen- of wespensteek. Voor deze kuur wordt u minimaal anderhalve dag in het ziekenhuis opgenomen. Voor deze opname moet u naast de gebruikelijke spullen in ieder geval meenemen:

- korte broek;
- eigen medicatie;
- shirt met korte mouwen.

## Wat gebeurt er allemaal bij de desensibilisatiekuur?

### Dag 1:

U wordt aan een bewakingsmonitor aangesloten, er wordt bloed bij u afgenomen en een infuus ingebracht. Daarna krijgt u met tussenpozen van 30 minuten injecties toegediend, 6 injecties wespengif of 5 injecties bijengif. De eerste injectie bevat een sterk verzwakte oplossing van het bijen- of wespengif. Elke volgende injectie bevat steeds een beetje meer van dat gif. De laatste injectie bevat de hoeveelheid gif die vergelijkbaar is met de steek van het betreffende insect. Regelmatig wordt uw bloeddruk gemeten. Ook andere reacties die optreden worden vastgelegd. Er is gedurende de hele kuur een verpleegkundige aanwezig en ook de arts zal het verloop nauwgezet controleren.

### Dag 2:

Op de tweede dag ontvangt u één injectie. Deze bevat weer de hoeveelheid bijen- of wespengif die vergelijkbaar is met de steek van het insect. Indien de, meestal plaatselijke reactie, binnen toelaatbare grenzen blijft, mag u dezelfde dag naar huis.

Het vervolg van de behandeling vindt plaats op de longfunctieafdeling.

### Dag 3:

U krijgt 2 injecties met 30 minuten tussenpauze. Na de 2e injectie moet u 30 minuten te wachten. Daarna mag u naar huis.

### Na 1 week:

U krijgt u 1 injectie. Vervolgens wordt de tijd tussen twee injecties steeds met één week verlengd, totdat de tussentijd zes weken bedraagt.

Hierna krijgt u iedere **6 weken** een injectie gedurende **5 jaar**. Dit kan bij uw huisarts plaatsvinden.

Na de injectie moet u 30 minuten te wachten. Daarna mag u naar huis.

**Let op: de injecties kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden. Het is aan te raden om de eerste weken niet alleen te komen!**

De eventuele controleprovocatie met de levende bij of wesp gebeurt altijd in overleg met uw behandelend longarts.

### Provocatie

Om de mate van bescherming van de desensibilisatiebehandeling te kunnen vaststellen is soms een provocatietest nodig. Voor deze test wordt u enkele uren opgenomen.

Ook hierbij wordt u aangesloten aan de bewakingsmonitor en wordt er bloed bij u afgenomen. Tevens wordt er een infuus ingebracht. In aanwezigheid van een arts en een verpleegkundige, wordt u in het bovenbeen, door desbetreffende insect, gestoken.

De eventuele reacties worden geobserveerd met behulp van bewakingsapparatuur. Regelmatig wordt uw bloeddruk gemeten. Ook andere reacties die optreden worden vastgelegd. Er is gedurende de hele provocatietest een verpleegkundige aanwezig en ook de arts zal het verloop nauwgezet controleren. Aan de hand van de reacties kan tevens de dosering voor de onderhoudsinjecties worden bepaald.

## Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek van de longartsen.

## Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Longartsen

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 13

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 53

### Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

### Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

### Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

