

Knieprothese

Inleiding

Uw orthopedisch chirurg heeft met u besproken dat u binnenkort een knieoperatie ondergaat. Tijdens deze operatie wordt uw beschadigde kniegewricht of een deel daarvan vervangen door een kunstgewricht ('prothese'). In deze folder informeren wij u over de ingreep.

Kniegewricht



Het kniegewricht bestaat uit drie botdelen, het scheenbeen het dijbeen en de knieschijf. Het gewricht kan bij het lopen en bewegen soepel scharnieren (bewegen), omdat er op de uiteinden van boven- en onderbeen een laag kraakbeen zit. Deze kraakbeenlaag is elastisch en kan schokken en stoten opvangen. Als een kniegewricht ernstig beschadigd of versleten is, is vervanging van het gewricht door een knieprothese vaak de enige oplossing.

Oorzaken

Er zijn verschillende afwijkingen die slijtage van het kniegewricht kunnen veroorzaken zoals:

- 'gewone' slijtage (artrose)
- een botbreuk;
- meniscusverwijdering.

Reumapatiënten hebben vaak knieproblemen omdat reuma het kraakbeen aantast. Het kniegewricht kan zo ernstig beschadigd zijn, dat vervanging door een knieprothese noodzakelijk is.

Klachten

Bij een beschadigde of versleten knie treedt pijn meestal op bij (trap)lopen en lang staan. Ook startpijn komt voor. Fietsen levert doorgaans de minste klachten op. Verder wordt het gewricht steeds stijver. Soms heeft de stand van het been (O-of X-been) ook invloed op de slijtage.

Pijn is vaak de voornaamste reden voor een operatie. Omdat een kunstgewricht (prothese) geen onbeperkte levensduur heeft, wordt de operatie bij jonge patiënten meestal zo lang mogelijk uitgesteld.

De ernst van de aandoening wordt vastgesteld door lichamelijk onderzoek, röntgenfoto's en eventueel met een kijkoperatie.

Knieprothese

Er zijn twee typen knieprothesen:

- totale knieprothese, die al het kraakbeen van zowel het dijbeen als het scheenbeen vervangt.
- halve knieprothese, die alleen een binnen- of buitenzijde van de knie vervangt.


De operatie is geen kleinigheid. Het herstel vraagt veel wilskracht en inspanning van de patiënt en zijn familieleden. Door een goede voorbereiding kunt u zich onnodige spanningen en teleurstellingen besparen.

Totale

knieprothese

Halve

knieprothese



Vorbereiding thuis

Voorafgaand aan uw ziekenhuisopname kunt u zelf alvast een aantal dingen regelen:

- Ophalen van 2 loopkrukken bij de thuiszorgwinkel. Voor alleenwonenden geldt, dat een rollator soms handig is om spulletjes te vervoeren. Ook een toiletverhoger is te verkrijgen via de thuiszorgwinkel.
- U kunt eventueel een bed beneden zetten voor wanneer u veel moet traplopen. U komt **niet** in aanmerking voor een bed via de wijkverpleging, hiervoor gelden bepaalde criteria. Bij het plaatsen van een knieprothese is het niet standaard noodzakelijk om het bed te verhogen.
- Als hulp bij het aankleden kan het handig zijn om een lange schoenlepel en eventueel elastische veters aan te schaffen. U kunt dan gemakkelijk zelf schoenen aantrekken.
- Een helping hand (grijpstok) is een handig hulpmiddel om gemakkelijk dingen van de grond op te rapen.
- Eventueel een plastic stoel met zijleuningen in de douche neerzetten.

Wanneer u mogelijk na ontslag uit het ziekenhuis verpleegkundige en/of huishoudelijke hulp heeft, neem dan contact op met een medewerker van het nazorgteam, telefoonnummer 0492 – 59 57 17.

Wanneer u problemen verwacht met de opvang van huisgenoten in de periode van de operatie kunt u vóór de operatie alvast contact opnemen met het CIZ (Centrum Indicatie Zorg), telefoon 088 – 78 91 650 (regio Helmond).

Thuiszorgwinkel

Het adres van de thuiszorgwinkel is Kanaaldijk Noordoost 18, 5701 SB Helmond, telefoonnummer 0492 – 34 87 82. Meer informatie vindt u op www.thuiszorgwinkel.nl

Let op: neem altijd een **legitimatiebewijs** mee.

Afspraak polikliniek Anesthesiologen

Wanneer u wordt geopereerd, krijgt u voorafgaand aan uw opname een afspraak bij de polikliniek Anesthesiologen. De anesthesioloog bespreekt met u de verschillende vormen van anesthesie en welke bij u wordt toegepast. Ook wordt aangegeven welke medicijnen u wel en welke u niet mag gebruiken. Meer informatie leest u in de folder 'Anesthesie'.

Keel/neuskweek

Bij elke operatie bestaat er een risico op een wondinfectie. Deze wondinfectie kan bij een (vaat)prothese ernstige gevolgen hebben.

Uit een uitgebreid onderzoek is gebleken dat er veel wondinfecties ontstaan door de Staphylococcus aureus-bacterie die de patiënt zelf bij zich draagt. Een eenvoudige behandeling kan het risico op wondinfecties verminderen. Om te kijken of u de staphylococcus aureus-bacterie bij u draagt, neemt de polikliniekassistent met een wattenstaafje een keel/neuskweek af. Meer informatie vindt u in de folder 'Vermindering van wondinfecties'.

Voorlichtingsbijeenkomst

Twee à drie weken voor de operatie ontvangt u een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Het is wenselijk dat u samen met uw partner/familielid/mantelzorger deze bijeenkomst bijwoont. Een fysiotherapeut en een verpleegkundige geven uitleg over:

- het revalidatieprogramma;
- de verpleegkundige zorg.

Dag van de operatie

Belangrijk

Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u **nuchter te blijven**. Dit betekent dat u **vanaf zes uur voor de opname:**

- **niets** meer mag eten.
- **niets** meer mag drinken (u mag **tot 2 uur voor de opname** alleen nog een beetje water drinken).
- **niet** meer mag roken

Neem medicatie die u thuis gebruikt in originele doosjes mee.



De operatie

Tijdens de operatie maakt de orthopedisch chirurg een verticale snee over de voorkant van de knie. De aangetaste gewrichtsvlakken worden verwijderd. Vervolgens wordt met speciale instrumenten het bot aangepast aan de vorm van de prothese, waardoor een goede verankering mogelijk is. Een kunststof schijf tussen de metalen delen van de prothese zorgt dat het gewricht soepel scharniert.

De operatie duurt 1 tot 3 uur, afhankelijk van de soort ingreep. Tijdens en ook na de ingreep krijgt u antibiotica om de kans op infectie te verkleinen.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapruimte waar u wordt bewaakt en gecontroleerd. U heeft een infuus en mogelijk een drain om het wondvocht af te voeren. Verder krijgt u morfine toegediend om de pijn tot een minimum te beperken. Wanneer u goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Om de wondgenezing te bevorderen heeft u tot vijf uur na de operatie een zuurstofkapje op.

Soms wordt de urine opgevangen door een blaaskatheter. Dit is een flexibel slangetje dat zorgt dat de urine uit de blaas kan lopen.

U krijgt medicijnen (injectie) toegediend om trombose te voorkomen. Ook na ontslag uit het ziekenhuis moet u dit gaan in de vorm van een injectie waarvan het de bedoeling is dat u dit gedurende zes weken zelf gaat doen. De verpleegkundige zal u hierin begeleiden.

Revalidatie in het ziekenhuis

De dag na de operatie komt de fysiotherapeut bij u langs. Er wordt gestart met oefeningen voor het buigen en strekken van de knie. Vaak is dit goed mogelijk door te oefenen op bed of op de bedrand. Wanneer dit moeizaam gaat, krijgt u een apparaat in bed, die ervoor zorgt dat de knie automatisch buigt en strekt. Wanneer de knie voldoende soepel buigt, start u met lopen onder begeleiding van de fysiotherapeut. Meestal wordt eerst begonnen met een rekje, zodat u kunt wennen aan uw 'nieuwe knie'. Al snel gaat u oefenen met krukken, omdat u hiermee beter kunt doorlopen. Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld als u alleen woont) kunt u ook met een rollator lopen. U mag **50% belast lopen** met een loophulpmiddel. Dit wil zeggen dat u de helft van uw gewicht op uw been mag steunen.

Adviezen bij het lopen

- De eerste zes weken na de operatie mag u uw geopereerde been nog niet volledig belasten. Daarom moet u deze periode lopen met 2 elleboogkrukken, rollator of een ander loophulpmiddel lopen. In overleg met de fysiotherapeut mag u binnenshuis eventueel met 1 elleboogkruk lopen.

Lopen met twee elleboogkrukken:

- Breng beide elleboogkrukken tegelijk naar voren.
- Plaats de voet van het geopereerde been tussen de twee krukken.
- Plaats vervolgens het niet geopereerde been een staplengte ervoor.
- Daarna gaat u twee weken met een loopkruk lopen. U houdt de loopkruk dan aan de **niet-geopereerde** zijde.

Lopen met één elleboogkruk:

- Pak de elleboogkruk aan de zijde van het niet geopereerde been.
- Breng de elleboogkruk naar voren.
- Plaats de voet van het geopereerde been ter hoogte van de kruk.
- Plaats vervolgens het niet geopereerde been een staplengte ervoor.
- U kunt beter meerder malen per dag een kort stukje lopen, dan te lang lopen. Maak dagelijks een aantal keer een korte wandeling om het genezingsproces, de bloedsomloop en de algehele conditie te verbeteren.
- Draag buitenshuis op stevige schoenen met een veerkrachtige hak.

Traplopen

Trap oplopen:

- Pak met een hand de trapleuning vast en houd in uw andere hand de beide krukken.
- Zet uw niet-geopereerde been op de volgende trede.
- Vervolgens plaatst u het geopereerde been en de elleboogkruk op dezelfde trede.



Trap aflopen:

- Pak met een hand de trapleuning vast en houd in uw andere hand de beide krukken.
- Zet de elleboogkruk 1 trede lager.
- Steun goed op de arMLEuning en de elleboogkruk.
- Zet uw geopereerde been op dezelfde trede naast de elleboogkruk.
- Plaats vervolgens uw niet-geopereerde been bij. Ook weer 1 hand aan de leuning en in de andere hand de kruk.



Ontslag

Indien u alles 'onder de knie' heeft, kunt u met ontslag. Meestal is dit drie tot vijf dagen na de operatie. Voordat u met ontslag gaat, neemt de verpleegkundige de ontslagpapieren met u door.

Controleafspraak

Ongeveer twee weken na de operatie komt u op de polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen.

Revalidatie thuis

Thuis start u met het knierevalidatieprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dit is een individueel aangemeten programma die vier tot vijf maanden duurt. Men start met het oefenen van buigen en strekken van de knie en ook het lopen verder uitgebreid. Als dit goed gaat, kan er gestart worden met fietsen op een hometrainer. Door 'gebruik' kan het geopereerde been dikker worden. Probeer zwelling zoveel mogelijk te beperken door geregeld uw geopereerde been omhoog te leggen.

U loopt zes weken met krukken en mag in die periode niet zelf deelnemen aan het verkeer (fietsen en autorijden).

Complicaties

Soms kunnen er complicaties optreden, zoals:

- Infectie van de knieprothese of het gebied er omheen.
- Nabloeding.
- Soms spoort de knieschijf niet goed. Dit geeft pijn bij buigen en het buigen is niet goed mogelijk;
- Het niet voldoende kunnen buigen en strekken van de knie. Indien nodig kan de arts besluiten om de knie onder narcose door te bewegen.
- Trombose. Om dit te voorkomen krijgt de patiënt gedurende zes weken bloedverdünnende middelen.
- Loslating van de prothese na langere tijd. De knieprothese kan dan eventueel vervangen worden.
- Vaat-en zenuwshade of bandletsel.
- Botbreuken
- Langdurig dik been.

Belangrijk:

Neem contact op met uw behandelend arts als:

- de wond gaat lekken.
- de wond (been) dik wordt en/of meer pijn gaat doen.
- u niet meer op het geopereerde been kunt staan, terwijl dit van tevoren goed mogelijk was.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van de orthopeden, telefoonnummer 0492 – 59 59 60. Bij dringende vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492 – 59 55 71.

Leven met een knieprothese

Knieprothesen zijn tegenwoordig van hoogwaardige kwaliteit en er wordt voortdurend gewerkt aan perfectionering. Een knieprothese kan los gaan zitten. Vaak is dan het plaatsen van een nieuwe prothese wel mogelijk. De kans op loslating met name op de lange termijn is de reden dat u jaarlijks of om de twee jaar wordt gecontroleerd. Een belangrijk onderdeel van deze controle is een röntgenfoto van de knie. In sommige gevallen leidt een infectie elders in het lichaam tot ernstige infectie rond de prothese.

Na plaatsing van een knieprothese en intensieve revalidatie is de pijn meestal verdwenen en de loopfunctie sterk verbeterd. Meestal kunt u de knie iets verder dan negentig graden ('haaks') buigen. Fietsen is daarom meestal wel mogelijk. Het wordt afgeraden de 'nieuwe knie' in werk en sport zwaar te belasten. De kans op beschadiging is dan immers groter. De orthopedisch chirurg kan u hierover adviseren.

Belangrijk:

Als knieprothesedragers blijft de kans op infectie, ook in de toekomst, bestaan. U moet uw huisarts, tandarts of specialist van te voren inlichten als tanden en kiezen getrokken worden, tandwortelbehandelingen plaatsvinden of operaties of andere inwendige ingrepen verricht worden. Wanneer bij deze ingrepen een gevaar van infectie dreigt, moet u met antibiotica beschermd worden.

Aanpassingen

Het kan zijn dat u na de ingreep bepaalde aanpassingen in huis nodig heeft. Wanneer het om tijdelijke aanpassingen gaat, zoals een verhoogde toiletbril of douchestoel kunt u contact opnemen met de Thuiszorgwinkel. Wanneer het gaat om langdurige noodzakelijke aanpassingen kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de afdeling WVG (wet voorziening gehandicapten) van uw gemeente.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, neem dan contact op met de polikliniek van de orthopeden, telefoonnummer 0492 – 59 59 60.

Aantekeningen

.....

.....

.....

.....

.....

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Orthopeden

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 20

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 60

Revalidatie

T: 0492 – 59 56 20

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

