

Plexus coeliacus- blokkade

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over een plexus coeliacus blokkade. Dit is een bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie over wat een zenuwblokkade is leest u in de folder 'Zenuwblokkade'.

Plexus coeliacus blokkade

De plexus coeliacus is een zenuwnetwerk in de bovenbuik die een rol speelt bij pijnklachten vanuit de ingewanden. Een plexus coeliacus blokkade is een onderbreking van dit zenuwnetwerk. Deze behandeling kan zinvol zijn bij pijnklachten als gevolg van kanker van organen in de bovenbuik, zoals de alvees-klier, de maag en de lever. Bij de behandeling wordt een stof in het zenuw-netwerk gespoten, waardoor de pijnprikkel de hersenen niet meer kan bereiken. De motoriek (bewegingsmogelijkheid) en het gevoel in de huid worden niet beïnvloed door deze behandeling. Uitsluitend de pijn in de ingewanden wordt geblokkeerd.

Vorbereiding

- Wanneer u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt (onder controle van de trombosedienst) moet u hier enkele dagen voor de blokkade mee stoppen. Dit mag **alleen** in overleg met de anesthesioloog.
- U mag gewoon eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

In het ziekenhuis

De zenuwblokkade gebeurt in dagopname. U dient zich te melden op de afdeling Dagopname. In het ziekenhuis volgt u de borden 'Kortverblijfafdeling' naar de 2e verdieping. Vervolgens volgt u de borden 'Dagopname'. Meld u bij de balie.

Behandeling

Voor de behandeling krijgt u een infuus. Tijdens de behandeling ligt u op uw buik. U krijgt één of twee prikken in uw rug naast de wervelkolom ter hoogte van de navel. De anesthesioloog/pijnbestrijder zoekt onder röntgendoorlichting met één of twee naalden naar de juiste plek. Hij/zij spuit dan de behandelvloeistof in rondom het zenuwnetwerk. De behandeling kan in principe onder een lokale verdoving plaatsvinden. Als het liggen op de buik voor u een te grote belasting is of teveel pijn doet kan in overleg worden gekeken of behandeling onder narcose mogelijk is. De behandeling duurt ongeveer een half uur. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis. Het resultaat van de blokkade wordt pas na één à twee dagen duidelijk. In een aantal gevallen is een aanvullende behandeling noodzakelijk. Het effect van de blokkade houdt gemiddeld enkele maanden aan.

Bijwerkingen en complicaties

- Na de behandeling kan de bloeddruk tijdelijk dalen, daarom krijgt u een infuus.
- Het tijdelijk optreden van diarree is een normaal verschijnsel.
- Soms kan er een stoornis in de blaasfunctie optreden, zodat een blaaskatheter noodzakelijk wordt. Deze complicatie komt zelden voor.
- In zeer zeldzame gevallen kan een dwarslaesie (verlamming van de benen) optreden.

Tot slot

Bij vragen, problemen of aanhoudende koorts, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de pijnpolikliniek. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijnpolikliniek

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 49

E: pijnpoli@elkerliek.nl

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

