

Sympaticusblokkade

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over de sympaticus blokkade. Dit een bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie over een zenuwblokkade leest u in de brochure 'Zenuwblokkade'.

Sympaticus blokkade

Een sympaticus blokkade is een blokkade van een gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel. Het onwillekeurige zenuwstelsel regelt allerlei lichaamsfuncties waar we normaal niet op letten, zoals hartslag, bloeddruk, doorgankelijkheid van de bloedvaten en transpireren. Deze zenuwen lopen aan de zijkant van de wervelkolom. Een sympaticus blokkade kan zinvol zijn bij problemen met de bloeddoorstroming in armen, handen en vingers, sympatische reflexdystrofie, bij bepaalde zenuwpijnen en bij bepaalde vormen van rugpijn.

Proefblokkade en definitieve blokkade

De anesthesioloog kan eerst proberen door één of meer proefblokkades vast te stellen welke zenuw de pijn geleidt. Als deze proefbehandeling een positief resultaat geeft wordt een definitieve behandeling gedaan.

Vorbereiding

Als u op de dag van behandeling koorts heeft kan de behandeling **niet** doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 8.30 uur contact op met de pijnpolikliniek. U kunt dan een nieuwe afspraak maken. Wanneer u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt (onder controle van de trombosedienst) moet u hier enkele dagen voor de blokkade mee stoppen. Dit mag **alleen** in overleg met de anesthesioloog. U mag gewoon eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

In het ziekenhuis

De zenuwblokkade gebeurt in dagopname. U dient zich te melden op de afdeling Dagopname. In het ziekenhuis volgt u de borden 'Kortverblijfafdeling' naar de 2e verdieping. Vervolgens volgt u de borden 'Dagopname'. U meldt zich aan de balie.

Behandeling

U ligt tijdens de behandeling op uw buik. De anesthesioloog geeft een plaatselijke verdoving via een prik in uw rug. Totaal moet u rekenen op ongeveer een halve dag in het ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat u **niet** zelf naar huis mag rijden.

Bijwerkingen en complicaties

Na een blokkade kan er zenuwpijn optreden of een doof gevoel in de huid. Daarnaast is er een zeer kleine kans dat de long wordt geraakt, waardoor een zogenoemde klaplong kan ontstaan. Verschijnselen hiervan zijn hoesten, pijn op de borst of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling nog optreden. Als u deze verschijnselen krijgt moet u **direct** naar het ziekenhuis gaan. Om de diagnose te stellen wordt een longfoto gemaakt. Het kan nodig zijn de klaplong met een drain te behandelen. U wordt dan opgenomen. Gelukkig komt dit heel weinig voor. Verder kan een bloeduitstorting of spierpijn ontstaan op de plaats waar geprikt is.

Tot slot

Bij vragen, problemen of aanhoudende koorts, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de pijnpolikliniek. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijnpolikliniek

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 49

E: pijnpoli@elkerliek.nl

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

