


Laserontharing bij een stoma

Inleiding

De haren op de huid rondom de stoma kunnen voor problemen zorgen. De meest bekende is het niet goed hechten van de stomaplak op de huid waardoor lekkages kunnen ontstaan. Ook irritatie van de huid of ontstekingen door ingegroeide haren komen voor. Het ontharen van de huid rondom de stoma door laserbehandeling kan een oplossing zijn voor deze problemen. In deze folder vindt u meer informatie over laserontharing bij een stoma.

IPL-laserontharing rondom de stoma

Op de polikliniek plastische chirurgie van het Elkerliek ziekenhuis ontharen we rondom de stoma met het AFT-IPL-laser flitsapparaat.



IPL staat voor Intense Pulsed Light en AFT voor Advanced Florescence Technology. Dit apparaat geeft korte lichtpulsen met een hoge energie.

De lichtpulsen worden geabsorbeerd door melanine (het pigment) in de haren. In melanine wordt het geabsorbeerde licht omgezet in warmte. In donkere haren bevindt zich veel pigment en ontstaat er dus veel warmte in de haar. Deze warmte wordt door de haar naar het haarzakje geleid en de haarwortel wordt vernietigd.

De beste resultaten worden verkregen met een lichte huid en donkere haren (zwart of bruin). Blond, witte, grijze en rode haren bevatten minder pigment. Om deze haren toch te kunnen verwijderen maken we gebruik van de Super Hair Removal (SHR-techniek). Het principe van de behandeling is hetzelfde, alleen duurt de behandeling per keer langer.

De haren groeien in drie verschillende fases: de actieve groeifase, de regressiefase en de rustfase. In de actieve groeifase bevindt zich het meeste pigment in het haarzakje. Dit neemt af in de regressiefase en in de rustfase. Het is dus belangrijk om het haar te laseren in de groeifase. Elke groeifase van de haar duurt enkele weken. Vandaar dat er meerdere behandelingen nodig zijn. Meestal zijn er 5 tot 10 behandelingen nodig om de 7 à 8 weken. Na deze behandelingen is 70 tot 90% van de haren weg en de overgebleven haren zijn dunner.

Na de behandeling

Tijdens de behandeling wordt het stomamateriaal verwijderd. Na de laserbehandeling is de behandelde huid soms wat roder en/of licht geïrriteerd. De meeste patiënten ervaren naderhand vrijwel geen last van de behandeling. Het stomamateriaal kan na de behandeling meteen teruggeplaatst worden.

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de laserbehandeling voor deze aandoening. Bij sommige verzekeraars dient eerst een machtiging aangevraagd te worden. Dat doet de lasertherapeute na uw eerste bezoek aan de polikliniek plastische chirurgie. Als uw zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, maken we met u een kostenberaming.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek plastische chirurgie.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend specialist. Nadere informatie over een behandeling of operatie krijgt u in een persoonlijk en kosteloos gesprek met een van de medisch specialisten.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de kliniek.

Aantekeningen

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Esthetiek

T 0492 – 59 59 64

E poliplasthelmond@elkerliek.nl

Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond

Dunantweg 16
5751 CB Deurne

