

Desensibilisatie voor grassen, bomen of huisstof Alutard

Inleiding

Het doel van desensibilisatietherapie of immunotherapie is om de ernst en duur van de allergische klachten te verminderen. De behandeling bestaat uit een injectiekuur met de stof die de klachten (allergie) veroorzaakt. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Desensibilisatie

De behandeling is erop gericht het eigen afweersysteem zo te beïnvloeden, dat de allergie afneemt en/of verdwijnt. U krijgt een injectie met de stof die de allergie veroorzaakt (allergeen).

Deze behandeling duurt over het algemeen drie tot vijf jaar. Soms blijft naast de injectiekuur aanvullende behandeling met geneesmiddelen nodig.

De injectiekuur

De injectiekuur bestaat uit twee fasen:

- de instelfase;
- de onderhoudsfase.

Bij de instelfase wordt er elke week een injectie toegediend. De hoeveelheid allergeen wordt wekelijks opgehoogd, totdat na drie maanden een bepaald maximum wordt bereikt. Daarna gaat de instelfase over in de onderhoudsfase, waarbij uiteindelijk 1x per maand de injectie wordt toegediend, en dit gedurende drie tot vijf jaar. De onderhoudsfase kunt u over het algemeen bij uw eigen huisarts laten verrichten.

Belangrijk:

Na het toedienen van de injectie moet u de rest van de dag zware lichamelijke inspanning (onder andere sporten) vermijden.

Ziekte en zwangerschap

- Als u zwanger bent moet u dit aan de arts/longfunctieanalist doorgeven. Bij de instelfase moet de kuur gestopt worden. De injecties in de onderhoudsfase kunnen in principe gewoon doorgaan.
- Bij flinke verkoudheden, ziekten met koorts en of vaccinaties (bijvoorbeeld de griepvaccinatie) moet de injectie minstens 1 week worden uitgesteld. Ook kan een vaccinatie niet eerder dan 1 week na de allergeen-injectie worden gegeven.

Bijwerkingen

Soms komt op de plaats van de injectie een jeukende zwelling en roodheid voor, die in de loop van enkele dagen weer verdwijnt. Meestal is dit alleen hinderlijk en niet ernstig. Een algemene allergische reactie met overal jeuk, jeukende ogen, niezen, kortademigheid en (uiterst zeldzaam) bloeddrukval komt sporadisch voor en moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Zodra u merkt dat u klachten krijgt of wanneer u zich niet lekker gaat voelen, moet u dat **direct** aan de arts of longfunctieanalist melden. Deze reactie komt in de meeste gevallen binnen een half uur na de injectie en daarom moet u ook een half uur blijven wachten.

Belangrijk:

Blijf altijd minstens **30 minuten** na de injectie wachten. Dit geldt voor de gehele duur van de kuur!

Zelden komt een reactie na enkele uren. Mocht dit wel zo zijn, neem dan contact op met de arts/longfunctieanalist of de dichtstbijzijnde huisarts.

Na een algemene reactie moet altijd worden nagegaan wat de mogelijke oorzaak is geweest. Daarna wordt besproken wat de verdere behandeling zal zijn.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Longartsen, telefoonnummer 0492 - 59 59 53.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Longartsen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 13
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 53

Longfunctieonderzoek
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 71 50
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 54 54

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55

