

Behandeling met Gilenya

Behandeling met Gilenya (Fingolimod)

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over de behandeling met Gilenya: wat zijn de effecten, bijwerkingen en waar moet u op letten.

Doel van de behandeling

Gilenya is een capsule voor de behandeling van Multiple Sclerose (MS) met een relapsing remitting (RR) verloop. Gilenya wordt een keer per dag ingenomen. Het wordt voorgeschreven aan mensen bij wie andere behandelingen, zoals een beta-interferon, glatirameer acetaat, Tysabri niet werken of bij mensen met MS met een snel ontwikkelend en ernstig verloop.

Gilenya kan MS niet genezen, maar kan toch het aantal Schubs doen afnemen. Hierdoor kan Gilenya de verdere ontwikkeling van de ziekte vertragen. Het kan betekenen dat MS langer stabiel blijft.

Bijwerkingen

Net zoals elk geneesmiddel kan ook Gilenya bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- infecties met het griepvirus
- hoofdpijn
- diarree
- rugpijn
- hoesten
- verhoogd aantal levereiwitten in het bloed.

Behandeling

Tijdens de behandeling met Gilenya vinden er aanvullende onderzoeken plaats:

- controle neuroloog
- bloedonderzoek
- hartfilmpje
- oogonderzoek bij oogarts
- eventueel een MRI

Afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken wordt het medicijn voorgeschreven.

Opname

U wordt op de dag van de onderzoeken om 07:30 uur opgenomen op de afdeling neurologie (3C). Op het einde van de dag mag u weer naar huis. U moet de medicatie op de dag van opname meenemen. De eerste inname van de capsule vindt plaats op de afdeling aan de monitorbewaking op de BCU.

De verpleegkundige zal u aansluiten aan de monitorbewaking waar uw bloeddruk, uw hartritme, uw zuurstofgehalte en uw ademhaling wordt geobserveerd. Ook zal de verpleegkundige uw temperatuur meten. Er wordt een infuusnaald ingebracht en er wordt nogmaals een hartfilmpje gemaakt. Het hartfilmpje wordt beoordeeld door de cardioloog, als deze akkoord is, mag u de zelf meegebrachte Gilenya innemen.

De eerste zes uur worden de controles elk uur gedaan. Bij eventuele veranderingen wordt er vaker gecontroleerd.

De verpleegkundige vraagt u om elk uur een stukje te gaan lopen. Dit om uw hartfrequentie op peil te houden.

Tijdens of binnen zes uur na inname kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

- vertraging in het hartritme
- hoofdpijn
- diarree
- rugpijn
- hoesten
- duizeligheid
- tintelend of dof gevoel
- slap gevoel
- jeuk (eczeem)

Ontslag

Na zes uur wordt er opnieuw een hartfilmpje gemaakt dat door de cardioloog wordt beoordeeld. Als er geen complicaties zijn geweest en de cardioloog en neuroloog gaan akkoord, mag u naar huis. De verpleegkundige verwijdert de infuusnaald en informeert u om bij klachten of symptomen van koorts, griepachtige verschijnselen en stoornissen met de ogen contact op te nemen met de neuroloog.

U krijgt een maand na ontslag een afspraak bij de MS-verpleegkundige. Vooraf moet u bloed laten prikken. U krijgt daarvoor een formulier mee. Ook wordt er een afspraak ingepland met de neuroloog en de oogarts ter nacontrole. De eerste zes maanden moet u de bloeddruk maandelijks laten controleren bij uw huisarts.

Belangrijke informatie

Zwangerschap

U mag tijdens en tot twee maanden na de behandeling met Gilenya niet zwanger worden omdat er voor de baby gezondheidsrisico bestaan. Bespreek zo nodig met uw arts passende anticonceptie. Mocht u in deze periode toch zwanger zijn geworden (gewenst of ongewenst), informeer dan direct uw arts.

Dosis Gilenya vergeten of tijdelijk moeten stoppen

Als u in de eerste maand van de behandeling een dosis Gilenya vergeet in te nemen, laat uw behandelend arts dit weten voordat u de volgende dosis inneemt. Uw arts kan besluiten dat de eerstvolgende dosis daaropvolgend in het ziekenhuis gegeven moet worden. Dit geldt ook als u vanaf de tweede maand langer dan twee weken Gilenya niet heeft ingenomen. Is dit korter dan twee weken, dan kunt u de volgende dosis innemen zoals gepland.

Klachten met kijken

Gilenya kan een zwelling van het netvlies achter de gele vlek veroorzaken, het zogenaamde macula-oedeem. Als u gedurende de behandeling of in de twee maanden daarna klachten met zien krijgt, informeer dan direct uw arts.

Leverfuncties controleren

Gilenya kan de uitslagen van leverfuncties beïnvloeden. Daarom zal Uw arts u voor, tijdens en na de behandeling hier regelmatig op controleren via een bloedprik.

Tot slot

Heeft u nog vragen neem dan gerust contact op met de poli of de MS verpleegkundige (e-mail mszorg@elkerliek.nl).

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Neurologie

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 14

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 54

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

