

Leukoplakie

Wat is leukoplakie

Leukoplakie is een witte aandoening van het mondslijmvlies. Leukoplakie kan op iedere plaats in de mond voorkomen, soms op meerdere plaatsen tegelijk, en gaat soms gepaard met een branderig gevoel. In een klein percentage van de gevallen kan leukoplakie kwaadaardig worden en overgaan in mondkanker.

Hoe ontstaat leukoplakie

Leukoplakie komt vooral voor boven het veertigste levensjaar, vooral bij mensen die veel roken. Bij geheel stoppen met roken blijken leukoplakieën soms binnen enkele maanden geheel te verdwijnen. Mocht dat niet het geval zijn, dan is advies van de tandarts of de huisarts gewenst.

Hoe wordt de diagnose gesteld

Er zijn veel witte afwijkingen van het mondslijmvlies. In een gering aantal van de gevallen gaat het om leukoplakie. Door een klein weefselstukje uit het veranderde slijmvlies te nemen, kan onder de microscoop worden bekeken of eventueel sprake is van kwaadaardige veranderingen of een voorstadium ervan. Mocht dit het geval zijn dan volgt aanvullend onderzoek.

De behandeling

Patiënten die roken worden dringend geadviseerd hiermee te stoppen. Wanneer de leukoplakie na enkele maanden niet is verdwenen, wordt deze verwijderd. Dit kan operatief of door middel van een laserbehandeling waarbij de afwijking wordt verdampt. Bovenstaande behandelingen vinden over het algemeen poliklinisch plaats onder plaatselijke verdoving.

Controle

Wanneer bij u een leukoplakie is geconstateerd dan zult u regelmatig voor controle moeten komen. Dit geldt ook voor patiënten die al zijn behandeld voor hun leukoplakie. Een enkele keer kan de leukoplakie na behandeling terugkomen of ontstaan er nieuwe leukoplakieën. Daarom worden patiënten met een leukoplakie vaak langdurig gecontroleerd, met een tijdsinterval van zes tot twaalf maanden. In sommige gevallen kunnen de controles aan de tandarts worden overgelaten.