

Besnijdenis bij kinderen Circumcisie

Inleiding

In overleg met uw arts wordt bij uw zoon een circumcisie/besnijdenis uitgevoerd. Voor deze ingreep wordt uw zoon een dag opgenomen op de afdeling Kind & Jeugd. In deze folder leest u meer over de ingreep.

Besnijdenis

Er zijn verschillende redenen om een besnijdenis uit te voeren. De meest voorkomende reden is een te nauwe voorhuid. Als er sprake is van een te nauwe voorhuid kunnen ontstekingen van de voorhuid of eikel ontstaan of moeilijkheden bij het plassen. De voorhuid wordt verwijderd, waarna de eikel onbedekt blijft. Dit heet besnijdenis of circumcisie. Ook schrijven bepaalde godsdiensten besnijdenis van jongens voor. Tenslotte zijn er ouders die bij hun zoon een besnijdenis wensen uit hygiënische overwegingen.

Voorbereiding

Bij een geplande dagopname is het belangrijk dat u en uw kind goed voorbereid zijn. Vertel uw kind waarom hij/zij wordt opgenomen in het ziekenhuis, hoe lang de opname duurt en dat het verblijf tijdelijk is. De leeftijd en de aard van uw kind bepalen wat u vertelt, op welke manier en op welk tijdstip. Vertel in ieder geval zo eerlijk en eenvoudig mogelijk wat er gaat gebeuren. Bij jonge kinderen is het geven van allerlei medische details overbodig. Deze kunnen meer angst oproepen. Vertel hen vooral wat ze zullen zien, voelen, horen, ruiken en dat ze mogen huilen. Ook is het goed om eerlijk te vertellen dat ze pijn kunnen hebben na de operatie.

Onze voorlichtingsfilm vindt u op onze kinderwebsite (www.elkerliek.nl/kind). We raden u aan om deze film vóór de afspraak met de anesthesioloog samen met uw kind te bekijken, zodat eventuele vragen gesteld kunnen worden tijdens de afspraak.

Boeken die u samen kunt lezen ter voorbereiding op de dagopname:

- Nijntje in het ziekenhuis - Dick Bruna (vanaf 2 jaar)
- Lucas en de slaapdokter - Stefan Boonen & Birgitte Vangehuchten (vanaf 3 jaar)
- Serie De ziekenboeg - Christine Kliphuis (vanaf 4 jaar)

Deze serie bestaat uit verschillende delen. Per deel is het verhaal toegespitst op een ziekte, aandoening of medische ingreep (bijvoorbeeld amandelen knippen, buisjes krijgen, scheve oogjes, blindedarmontsteking).

Vorbereiding thuis

Uw kind **moet** voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind na een bepaald tijdstip niets mag eten en drinken. Meer hierover leest u in de folder 'Anesthesie voor kinderen tot 18 jaar'.



In het ziekenhuis

U meldt zich aan de balie op de afdeling Kind & Jeugd. De verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling en bereidt uw kind voor op de operatie.

De operatie

Na het toedienen van de anesthesie (narcose) wordt de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk verwijderd. De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. De penis wordt verbonden met een vettig gaasje.

Na de operatie

Wanneer uw kind goed wakker is, gaat het terug naar de afdeling. De verpleegkundige voert controles uit en uw kind krijgt drinken/eten. Wanneer uw kind naar huis mag, krijgt u een controleafspraak mee. Het is verstandig dat uw kind deze dag thuis rustig aan doet.

Weer thuis

Uw kind kan een paar dagen last hebben van een pijnlijk gevoel rondom de wond. Om de pijn te verlichten mag u kinderparacetamol (tabletten of zetabletten) geven volgens de bijsluiter. Deze zijn te koop bij apotheker of drogist.

Na de ingreep ziet de penis er gezwollen en blauw/rood uit. Dit verdwijnt in de loop van de week. Het beste kunt u de penis omhoog leggen, richting de navel.

Het gaasje dat ter bescherming na de ingreep is aangebracht, blijft ongeveer 24 uur zitten. Uw zoon kan in de douche of in bad het gaasje losweken (**niet los trekken**). Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes. na het douchen het wondgebied dun insmeert met vaseline.

Bij het plassen kan uw kind de eerste tijd een branderig gevoel hebben.

Uw kind mag de eerste week na de operatie **niet zwemmen**.

Complicaties

De kans op infectie of nabloeding is bij deze ingreep aanwezig. Neem in de volgende gevallen altijd contact op met de polikliniek Urologen:

- de pijn wordt erger.
- er bloed of pus uit de wond komt
- de penis wordt steeds dikker.
- Als uw kind koorts heeft boven 38 °C.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp, telefoon 0492 – 59 55 71.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologen, telefoon 0492 – 59 59 50.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Urologie

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 10

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 50

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55

