

Blaassteen verwijderen via de buik

Sectio Alta

Inleiding

U heeft met uw medisch specialist afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen voor het verwijderen van blaassteen. In deze folder leest u meer over deze ingreep.

Waarom een operatie?

Een blaassteen kan pijn, plasklachten en blaasontsteking veroorzaken. Tevens kan een blaassteen de blaaswand beschadigen zodat bloedverlies optreedt.

Afspraak polikliniek anesthesiologen

Wanneer u wordt geopereerd, krijgt u voorafgaand aan uw opname een afspraak bij de polikliniek anesthesiologen. De anesthesioloog bespreekt met u de verschillende vormen van anesthesie en welke bij u wordt toegespast. Ook wordt aangegeven welke medicijnen u wel en welke u niet mag gebruiken. Bij gebruik van bloedverdünnende medicijnen wordt u besproken hoeveel dagen voor de ingreep u hiermee moet stoppen. Meer informatie leest u in de folder "anesthesie".

Belangrijk

Voor deze ingreep dient u nuchter te blijven. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor de opname:

- Niets meer mag eten.
- Niets meer mag drinken (u mag tot twee uur voor de opname alleen nog een beetje water drinken).
- Niet meer mag roken.

Bijvoorbeeld:

Als u om 8.00 uur wordt opgenomen, mag u vanaf 2.00 uur 's nachts niets meer eten en niet meer roken en mag u tussen 2.00 en 6.00 uur alleen nog wat water drinken.

Op de afdeling

Bij aankomst op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Zij zal u wegwijs maken op de afdeling en eventuele vragen beantwoorden. Vervolgens wordt u voorbereid voor de operatie. U krijgt eventueel een medicijn toegediend waar u slaperig van wordt. Tevens krijgt u een antistollingsmiddel toegediend om trombose te voorkomen.

De operatie

Tijdens de operatie wordt via een snede in de onderbuik de blaas geopend en de steen verwijderd. U krijgt een of twee katheters, een om de urine af te laten afvloeien en/of een via de buikwand. Gemiddeld duurt de operatie drie kwartier.

Na de operatie

Wanneer u weer terug bent op de afdeling heeft u een infuus. Hiermee krijgt u extra vocht toegediend. Wanneer u geen infuus meer heeft is het belangrijk om veel te drinken, 1 ½ -2 liter per dag. De uroloog bepaalt wanneer de eventuele katheter(s) en de hechtingen verwijderd mogen worden.

Opnameduur

Voor deze ingreep wordt u 1 tot 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis. U krijgt een controle afspraak mee als u naar huis gaat.

Weer thuis

- De urine kan enige dagen tot weken bloederig zijn. Zolang de urine bloederig is, is het belangrijk om veel te drinken 1 ½ -2 liter per dag.
- Bij koorts, temperatuur meer dan 38 graden neemt u contact op.
- Aangeraden wordt om 2 weken niet zwaar te tillen of te fietsen.
- Sportactiviteiten, baden en zwemmen wordt gedurende 4 weken afgeraden.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Urologie, telefoonnummer 0492 – 59 59 50 kies optie 2. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp, telefoonnummer 0492-595571

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Urologie

Locatie Deurne

T: 0493 – 32 89 10

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 50

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

