

Intercostale blokkade

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over de intercostale blokkade. Dit is een bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie over een zenuwblokkade leest u in de brochure 'Zenuwblokkade'.

Intercostale blokkade

Een intercostale blokkade is een behandeling waarbij met een naald een zenuw die onder een rib loopt wordt verdoofd. Meestal wordt eerst een aantal proefblokkades gedaan. Dit kan zinvol zijn bij pijnklachten na bijvoorbeeld een longoperatie of bij pijnklachten vanuit de rib.

Vorbereiding

- Als u op de dag van behandeling koorts heeft kan de behandeling **niet** doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 8.30 uur contact op met de pijnpolikliniek. U kunt dan een nieuwe afspraak maken.
- Wanneer u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt (onder controle van de trombosedienst) moet u hier enkele dagen voor de blokkade mee stoppen. Dit mag **alleen** in overleg met de anesthesioloog.
- U mag gewoon eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.

In het ziekenhuis

De zenuwblokkade gebeurt in dagopname. U dient zich te melden op de afdeling Dagopname. In het ziekenhuis volgt u de borden 'Kortverblijfafdeling' naar de 2e verdieping. Vervolgens volgt u de borden 'Dagopname'. Meld u aan de balie.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u meestal op uw buik. De anesthesioloog plaatst onder röntgendoorlichting een naald net onder een rib. Door het inspuiten van een verdovingsvloeistof wordt een tijdelijke verdoving veroorzaakt. Als door proefblokkades duidelijk is welke zenuw precies de pijn geleidt, kan een langer werkende behandeling worden gedaan door middel van het verhitten van de naaldpunt. Totaal moet u rekenen op ongeveer een halve dag in het ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat u **niet** zelf naar huis mag rijden. Het kan een aantal dagen duren voor het effect van de behandeling kan worden beoordeeld.

Bijwerkingen en complicaties

Er is een kleine kans dat het longvlies wordt geraakt, waardoor een zogenoemde klaplong kan ontstaan. Verschijnselen hiervan zijn hoesten, pijn op de borst of kortademigheid. Dit kan enkele uren na de behandeling nog optreden. Als u deze verschijnselen krijgt moet u **direct** naar het ziekenhuis gaan. Om de diagnose te stellen wordt een longfoto gemaakt. Het kan nodig zijn de klaplong met een drain te behandelen. U wordt dan opgenomen. Gelukkig komt dit heel weinig voor. De behandeling leidt zelden tot ongewenste, blijvende schade. De anesthesioloog overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Tot slot

Bij vragen, problemen of aanhoudende koorts, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de Pijnpoli-
kliniek. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijnpolikliniek

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 49

E: pijnpoli@elkerliek.nl

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

