

Therapeutisch perifere zenuwinjectie

Inleiding

In deze folder vindt u informatie over de therapeutische perifere zenuwinjectie. Dit een bepaald soort zenuwblokkade. Algemene informatie over een zenuwblokkade leest u in de brochure 'Zenuwblokkade'.

Therapeutische perifere zenuwinjectie

Een therapeutische injectie bij een perifere zenuw wordt toegepast als pijn ontstaat door of via een oppervlakkig lopende zenuw in hoofd, buik, schouders, arm of been. De behandeling bestaat uit het inspuiten van een verdovende/ontstekingsremmende vloeistof rondom de betreffende zenuw, of door de zenuw te behandelen met een klein stroompje (gepulseerde radiofrequente behandeling).

Vorbereiding

- Als u op de dag van de behandeling koorts heeft kan de behandeling **niet** doorgaan. Neem in dat geval tussen 8.00 en 8.30 uur contact op met de pijnpolikliniek. U kunt dan een nieuwe afspraak maken.
- Wanneer u **bloedverdunnende medicijnen** gebruikt (onder controle van de trombosedienst) moet u hier enkele dagen voor de blokkade mee stoppen. Dit mag **alleen** in overleg met de anesthesioloog.
- U mag gewoon eten en drinken en uw overige medicijnen innemen, tenzij de arts anders voorschrijft.
- U mag 24 uur niet deelnemen aan het verkeer, dus zorg voor vervoer naar huis.

In het ziekenhuis

De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte pijnbehandelruimte op de 2^e etage van locatie Helmond. Met de lift bij het winkeltje gaat u naar de 2^e verdieping, vandaaruit volgt u de borden pijnbehandeling. U kunt zich melden bij de verpleegkundige.

Behandeling

Tijdens deze behandeling zit u op een stoel of ligt u op een onderzoektafel. De behandeling gebeurt door inspuiting van verdovende vloeistof rondom een zenuw waaraan een ontstekingsremmer is toegevoegd, of door de zenuw te behandelen met gepulseerde radiofrequentie. Het effect van de behandeling is pas na een aantal weken goed te beoordelen. Hiervoor wordt automatisch een telefonische controle afspraak ingepland.

Bijwerkingen en complicaties

Er zijn weinig complicaties. De mogelijke complicaties zijn afhankelijk van welke zenuw behandeld wordt. Uw anesthesioloog informeert u hierover.

Tot slot

Bij vragen, problemen of aanhoudende koorts, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de pijnpolikliniek. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers en adressen

Pijncentrum

Locatie Helmond

T: 0492 – 59 59 49

E: pijncentrum@elkerliek.nl

Spoedeisende hulp

T: 0492 – 59 55 71

Locatie Helmond

Wesselmanlaan 25

5707 HA Helmond

T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne

Dunantweg 16

5751 CB Deurne

T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert

Julianastraat 2

5421 DB Gemert

T: 0492 – 59 55 55

